



# Addora low studie

In deze studie wordt onderzocht of afbouwen van adalimumab op geleide van medicijnspiegels naar een concentratie van 2 mg/L net zo effectief is als een concentratie van 5 mg/L voor het behouden van lage ziekteactiviteit.

## Hoe wordt dit onderzocht?


Proefpersonen met een adalimumab serumconcentratie boven de 5 mg/L worden gerandomiseerd tussen twee studiegroepen. De ene groep bouwt adalimumab af tot een serumconcentratie van 5 mg/L, terwijl de andere helft adalimumab afbouwt tot een serumconcentratie van 2 mg/L. De studie heeft een follow-up van 24 weken waarin 3 studievizites plaatsvinden op tijdstipmomenten 0, 12 en 24 weken.

## Deelname mogelijk?

Ja, deelname is mogelijk. Vraag hiervoor een verwijzing via jouw reumatoloog.

## De Biobank

De Biobank werkt nauw samen met de onderzoeker van de studie waaraan je deelneemt. Nadat je schriftelijke toestemming hebt gegeven voor het desbetreffende onderzoek wordt er wat extra bloed geprikt. Soms kan ook naar urine gevraagd worden. Deze materialen worden door de Biobank voor een langere periode ingevroren in grote vriezers. Op aanvraag van de onderzoeker kan er materiaal uit de vriezers gehaald worden om extra laboratoriumonderzoek mee te doen. Dit onderzoek kan voor jou leiden tot verbetering van de behandeling waardoor je mogelijk minder klachten ervaart.



Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

T (020) - 242 10 00 | [klantenservice@reade.nl](mailto:klantenservice@reade.nl)