



Fluoride PET-studie

Beeldvorming en monitoring axiale en perifere botvorming bij SpA bij Secukinumab of anti-TNF starters

Hoe wordt dit onderzocht?


Secukinumab starters: Fluoride whole body PET op baseline en na 12 weken (n=15). Anti-TNF óf secukinumab starters: Op baseline whole body PET en wervel biopten (indien PET positief voor botaanmaak) (n=8). Klinische follow-up op t=6, 12 en 24 weken.

Deelname mogelijk?

Ja, deelnemen is mogelijk. Vraag hiervoor een verwijzing via jouw reumatoloog.

De Biobank

De Biobank werkt nauw samen met de onderzoeker van de studie waaraan je deelneemt. Nadat je schriftelijke toestemming hebt gegeven voor het desbetreffende onderzoek wordt er wat extra bloed geprikt. Soms kan ook naar urine gevraagd worden. Deze materialen worden door de Biobank voor een langere periode ingevroren in grote vriezers. Op aanvraag van de onderzoeker kan er materiaal uit de vriezers gehaald worden om extra laboratoriumonderzoek mee te doen. Dit onderzoek kan voor jou leiden tot verbetering van de behandeling waardoor je mogelijk minder klachten ervaart.



Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

T (020) - 242 10 00 | klantenservice@reade.nl