



# JaJa studie

Gerandomiseerde trial naar de veiligheid omtrent veneuze trombose van baricitinib, bij mensen met RA in risicogroepen voor trombose.

## Hoe wordt dit onderzocht?

Cliënten worden gerandomiseerd over drie groepen:

1. Baricitinib 4 mg oraal dagelijks
2. Baricitinib 2 mg oraal dagelijks
3. TNF-alfa blokker (adalimumab of etanercept standaard dosering).

De follow up duur is 5 jaar of tot optreden van trombose. Cliënten blijven in zorgpad biologicals. Daarnaast zijn er half-jaarlijkse studie-visites voor evaluatie van het optreden van veneuze trombose.

## Deelname mogelijk?

Nee, het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan deze studie.

## De Biobank

De Biobank werkt nauw samen met de onderzoeker van de studie waaraan je deelneemt. Nadat je schriftelijke toestemming hebt gegeven voor het desbetreffende onderzoek wordt er wat extra bloed geprikt. Soms kan ook naar urine gevraagd worden. Deze materialen worden door de Biobank voor een langere periode ingevroren in grote vriezers. Op aanvraag van de onderzoeker kan er materiaal uit de vriezers gehaald worden om extra laboratoriumonderzoek mee te doen. Dit onderzoek kan voor jou leiden tot verbetering van de behandeling waardoor je mogelijk minder klachten ervaart.

## Heb je nog vragen?



> **Drs. R. Raadsen (Reinder)**  
Reumatoloog

[Neem contact op](#)



Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

T (020) - 242 10 00 | [klantenservice@reade.nl](mailto:klantenservice@reade.nl)